

"Der Chirurg der niemals eine Komplikation hat, der operiert nicht" (Cooley-Wukasch 1980)

Organ(n.OPS 2007)	Anzahl Operationen	Anzahl Letalität	operationspflichtige Revisionen in %	Wundinfekt in %	Nachblutung in %	Luftfistel > 7 Tage in %	Recurrensparesen in % ²⁾	Hypoparathyreoidismus in % ³⁾	Anastomosensuffizienzen in %	Platzbauch in %	Andere in %
Schilddrüse	253	0	3,16	1,18	2,37		1,18%	0,92			
Ösophagus	16	1	n= 1	0	0				n=1		
Magen *	52	3	n= 2	n= 2	n= 1				n=1	n=1	
Galle/Gallenwege	190	0	0	1,05	0,52 ⁴⁾						0,93
Leber	17	0	0	n=1	0						n=1
Pankreas	12	0	n=1	n=1	0						n=2 ⁵⁾
Hernien	264	0	1,51	1,13	1,89						1,25
Dünn-,Dick-, Mastdarm 1 *	288	9 *(3,12%)	8,33	7,98	1,38				2,08	0,69	3,98
Thorax/Lungen *	254	5 *(1,96%)	4,33	0,39	2,36	3,93	1,57				3,54

* Letalität, Revisionen u. Komplikation in % der Eingriffe (bei kleinen Zahlen n = Anzahl der Pat.) incl. Notfall- und Palliativoperationen (s. Mortalitätsstatistik) (Mehrfachnennung incl.)

Die Komplikationen wurden im Zuge der wöchentlichen Komplikationsbesprechung durch eine Qualitätssicherungsmitarbeiterin erfasst

¹⁾ ohne Appendices

²⁾ permanente Parese (n=3 /1,18% bei 2 positiven Neurosignalen) passagere Parese (n= 18 / 7,11%)(bei 17 Patienten positives Neurosignal)

³⁾ passager n=8 , permanent n=1

⁴⁾ nicht revisionsbedürftig

⁵⁾ n=2 Pankreasfistel/biliodigestive Fistel (n=2) (durch eine PTC ausgeheilt)

⁶⁾ Gallenfistel