

"Der Chirurg der niemals eine Komplikation hat, der operiert nicht " (Cooley-Wukasch 1980)

Organ(n.OPS 2007)	Anzahl Operationen	Anzahl Letalität	operationspflichtige Revisionen	Wundinfekt	Nachblutung	Luftfistel > 7 Tage	Recurrensparesen ²⁾	Hypoparathyreoidismus ³⁾	Anastomosens-Bronchusstumpfsuffizienzen	Platzbauch	Andere in %
Schilddrüse	247	0	4,04%	0	4,45%		1,61%	0,80%			
Ösophagus	12	0	0	0	0				n=2 ⁴⁾		
Magen	30	0	n=2	n= 1	0						n=1
Galle/Gallenwege	230	0	n=1	1,05%	0						n=1
Leber	20	0	n=1	n=1	0						n=1 ⁶⁾
Pankreas	12	0	n=2	n=2	0					n=1	n=2 ⁵⁾
Hernie	257	0	1,94%	1,94%	n=1						n=1
Dünn-,Dick-, Mastdarm 1 *	279	2,50% *	10,39 % *	8,24%	1,07%				2,50%	1,43%	2,15%
Thorax/Lunge *	217	1,84%*	5,06%	1,03%	0	8,27%	1,38%		n=2		3,68%

* Letalität, Revisionen u. Komplikation in % der Eingriffe (bei kleinen Zahlen n = Anzahl der Pat.) incl. Notfall- und Palliativoperationen (s. Mortalitätsstatistik) (Mehrfachnennung incl.)

Die Komplikationen wurden im Zuge der wöchentlichen Komplikationsbesprechung durch eine Qualitätssicherungsmitarbeiterin erfasst

¹⁾ ohne Appendices

²⁾ permanente Parese (n=4 /1,6 % bei 1 Pat. positive Neurosignal Op. Dez 08) passagere Parese (n= 21 / 8,5%)(bei 17 Patienten positive Neurosignale)

³⁾ passager n=5 , permanent n=2 (Calciumpflichtig ohne Symptome)

⁴⁾ Therapie durch Stentimplantation

⁵⁾ n=2 Pankreasfistel/biliodigestive Fistel (n=2) (durch eine PTC ausgeheilt)

⁶⁾ Gallenfistel (konservativ ausgeheilt)