

Tab. 2

Florence-Nightingale-Krankenhaus

Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Endokrine Chirurgie

Mortalitätsstatistik 2010

Elektive Operationen

Pat.	Alter	Risikofaktoren	Op-Indikation	Operation	Todesursache
S., W.	82	Lungen- Lebermetastasen	Rectumcarcinom	Rectumresektion	Anastomoseninsuffizienz Platzbauch, Sepsis
U., I.	73	COPD Sjögren-Syndrom nekrotisierende Cholangitis Gallenblasenperforation, gedeckt	Pankreskopfcarcinom	Whipple Operation	Anastomoseninsuffizienz Hepatorenales Syndrom Sepsis
H., I.	77	chronische Niereninsuffizienz Hypertonie	Pankreasschwanzcarcinom	subtotale Pankreas-links- Resektion Pankeasblindverschluss	Sepsis bei Pankreasfistel
B., U.	72	COPD Leberzirrhose (C ₂ H ₅ OH) Delir	Flexur-Carcinom links	erweiterte Hemikolektomie links	Bolus-Tod bei Aspiration gedeckte Anastomoseninsuffizienz
F., C.	79	diffuse Lungen- und Lebermetastasen	Ascendens-Carcinom	Hemikolektomie rechts	Sepsis bei Spätinsuffizienz
Mittelwert	76,6				